

艾舒®

OTC  
甲类

# 右美沙芬愈创甘油醚糖浆说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

## 【药品名称】

通用名称：右美沙芬愈创甘油醚糖浆  
英文名称：Dextromethorphan Hydrobromide  
and Guaiifenesin Syrup  
汉语拼音：Youmeishafen Yuchuanganyoumi Tangjiang

## 【成份】

本品为复方制剂，每10毫升中含氢溴酸右美沙芬15毫克，愈创甘油醚100毫克。辅料为：甘油、丙二醇、山梨醇溶液、单糖浆、无水柠檬酸、苯甲酸钠、亮兰色素、清凉薄荷香精和纯水。

## 【性状】

本品为浅蓝色至蓝绿色的澄清粘稠液体；具有特异性薄荷味。

## 【作用类别】

本品为镇咳祛痰类非处方药药品。

## 【适应症】

用于上呼吸道感染（如普通感冒和流行性感冒）、支气管炎等引起的咳嗽、痰多。

## 【规格】

每1毫升含氢溴酸右美沙芬1.5毫克，愈创甘油醚10毫克。

## 【用法用量】

口服，12岁以上儿童及成人一次10-20毫升，一日3次，24小时内不超过4次。

## 【不良反应】

1. 可见头晕、头痛、嗜睡、易激动、暖气、食欲缺乏、便秘、恶心、皮肤过敏等，停药后上述反应可自行消失。
2. 可见失眠、精神运动功能亢进、烦躁、腹泻、呕吐、瘙痒、皮疹、荨麻疹、血管性水肿或其他过敏反应。

## 【禁忌】

1. 对氢溴酸右美沙芬或愈创甘油醚过敏者禁用。
2. 妊娠3个月内妇女禁用。
3. 正在服用单胺氧化酶抑制剂(MAOI, 用于抗抑郁及治疗帕金森氏病等)或停止MAOI治疗2周内的患者禁用。

## 【注意事项】

1. 用药7天，症状未缓解，或症状恶化或出现新的症状，应停药并咨询医师或药师。
2. 抑郁症、消化道溃疡、痰量过多、哮喘、持续性或慢性咳嗽等患者以及老年人应在医师指导下使用。

3. 孕妇及哺乳期妇女慎用。
4. 服药期间不得驾驶机动车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。
5. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
6. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
7. 本品性状发生改变时禁止使用。
8. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
9. 儿童必须在成人监护下使用。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。
11. 若咳嗽出现复发迹象或伴有发热、皮疹或持续性头痛，请咨询医师或药师。
12. 对于持续性呼吸系统疾病（如肺气肿、慢性支气管炎）患者在使用本品前请咨询医生。

## 【药物相互作用】

1. 本品与抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂同服会产生不良反应，应避免合用。
2. 本品不宜与乙醇及其他中枢神经系统抑制药物并用，因可增强对中枢的抑制作用。
3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

## 【药理作用】

氢溴酸右美沙芬为中枢性镇咳药，可抑制延髓咳嗽中枢而产生镇咳作用，其镇咳作用与可待因相等或稍强，长期服用无依赖性和耐受性；愈创甘油醚为祛痰剂，能使呼吸道腺体分泌增加，使痰液稀释，易于咳出。

## 【贮藏】

遮光，密封，在阴凉处保存。

## 【包装】

口服液体药用高密度聚乙烯瓶装，150毫升/瓶，1瓶/盒。

## 【有效期】

24个月

## 【执行标准】

WS<sub>2</sub>-(X-069)-2004Z-2016

## 【批准文号】

国药准字 H20143186

## 【说明书修订日期】

2019年01月09日

## 【生产企业】

企业名称：上海强生制药有限公司  
生产地址：上海市闵行经济技术开发区绿春路139号  
邮政编码：200245  
电话号码：800-820-1188 400-888-3060

如有问题可与生产企业联系



6116881

